

Informācija par produktu

Ādas antiseptiķis

schülke -†



Lietošanai gatavs antiseptiķis ādas dezinfekcijai pirms un pēc operācijas, kā arī pirms asins paraugu ņemšanas un injekcijām

kodan[®] tinctur forte

Mūsu plusi:

- plaša spektra antiseptiskā iedarbība
- ātra iedarbība (15 sek. pirms injekcijām)
- pēc izžūšanas labā incīzijas folijas saķere
- laba ādas ādas panesamība
- prolongēta iedarbība ir 3 stundas

Pielietojums

- ādas dezinfekcijai pirms operācijām, asins paraugu ņemšanas, injekcijām, punkcijām, kā arī pirms ekscīzijām, biopsijas ņemšanas un kanulācijām
- brūču un šuvju apstrādei
- higiēniskai roku dezinfekcijas (tikai kodan[®] tinctur forte bezkrāsains)
- vispārējo higiēnas pasākumu uzturēšanai ādas sēnīšu infekciju profilaksē

Lietošanas indikācijas

Ādas antiseptiskā apstrāde pirms injekcijām, punkcijām, Kontaktā laiki ekscīzijām u.c.:

Apsmidziniet savainotus ādas apgabalus ar kodan[®] tinctur forte vai apstrādājiet tos ar piesūcinātu svābu, ievērojot kontakta laiku. Izmantojot kodan[®] tinctur forte pirms glikozes testiem (piem., haemogluco testa stripi) ļaujiet preparātam pilnībā nožūt, lai neietekmētu testa rezultātus.

Ādas antiseptiskā apstrāde pirms operācijām un locītāvu punkcijām:

Ja nepieciešams, noskūt apstrādājamu ādas apgabalus.

Ja iespējams, nomazgājiet pacientu vai apstrādājamu ādas apgabalu vismaz vienu stundu pirms ādas dezinfekcijas (ar piem., esemtan[®] vai octenisan[®] mazgāšanas losjoniem).

Uznesiet kodan[®] tinctur forte, izmantojot sterīlu svābu vai izsmidzinot preparātu.

Lietojot incīzijas foliju, jānogaida pilnīga ādas izžūšana, lai izvairītos no pārmērīgas saķeres.

Lietojiet termokauteri tikai pēc pilnīgas ādas izžūšanas.

Brūču un šuvju apstrāde:

Brūču un šuvju apstrādei kodan[®] tinctur forte jālieto, uznesot to ar sterīlu svābu vai izsmidzinot to no pudeles. Lūdzu, pārliecinieties, lai lieks šķīdums ir notecējis vai tiktu noslaukts. Ķirurģiskus šuvjus ir ieteicams apstrādāt ar kodan[®] tinctur forte šķīdumā mērcētu tamponu.

Higiēniskā roku dezinfekcija:

Higiēniskās roku dezinfekcijas gadījumā rokām ir jābūt samitrinātām ar dezinfektantu visa kontakta laikā.

Mikrobioloģiskā efektivitāte

kodan[®] tinctur forte ir efektīvs pret:

- baktērijām (t.sk. mikobaktērijām (Tb))
- sēnītēm
- iekapsulētajiem vīrusiem (t.sk. HBV, HIV, HCV, herpes simplex vīrusiem)
- rota- un adenovīrusiem

Kontakta laiki

Pielietošana / baktērijas	Lietošanas rekomendācijas / Kontakta laiks
Āda ar tauku dziedzeru pazeminātu darbību (saskaņā ar VAH-/DGHM sertifikātu):	
• Pirms injekcijām un asins paraugu ņemšanas:	15 sek.
• Pirms locītāvu punkcijām:	60 sek.
• Pirms un pēcoperatīvā ādas dezinfekcija:	60 sek.
Higiēniska roku dezinfekcija (atbilstoši VAH-/DGHM sertifikātam):	3 ml neatšķaidīta kodan tinctur forte bezkrāsaina - 30 sek.
MRSA	30 sek.
Vīrusi:	
• Iekapsulētie vīrusi (t.sk. HBV, HIV, HCV, herpes simplex vīrusi):	30 sek.
• rotavīrusi	30 sek.

kodan[®] tinctur forte

Informācija par produktu

Sastāvs: 100 g šķīduma satur: aktīvās farmaceitiskās sastāvdaļas: 45,0 g 2-propanols, 10,0 g 1-propanols, 0,20 g 2-bifenilols

Pārējās sastāvdaļas: 30% ūdeņraža peroksīda šķīdums (Ph.Eur), attīrīts ūdens.

kodan[®] tinctur forte iekrāsots satur arī krāsvielas E 104, E 110, E 151.

Ķīmiski-fizikāli dati:

iekrāsots	
Izskats:	brūns
Blīvums:	0,896 ± 0,003 g/ml
bezkrāsains	
Izskats:	bezkrāsains
Blīvums:	0,896 ± 0,003 g/ml
Temperatūras stabilitāte:	stabiļs no -5 °C līdz +40 °C
Uzliesmošanas temperatūra:	24 °C (saskaņā ar DIN 51755)

Īpaši norādījumi

kodan[®] tinctur forte lietoto neatšķaidītu un apstrādājamiem ādas apgabaliem jābūt pilnībā samitrinātiem. Ārīgai lietošanai. Turēt bērniem nepieejamā vietā. Uzliesmojošs. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas.

Piegādes formas / Iepakojumu veidi

Produkts	Iepakojums	Kods
kodan[®] tinctur forte bezkrāsains 250ml pudele ar smidzinātāju 1L pudele	10 x 250ml 10 x 1L	104 012 104 007
kodan[®] tinctur forte iekrāsots 250ml pudele ar smidzinātāju 1L pudele	10 x 250ml 10 x 1L	104 802 104 804

Aksesuāri / Dozēšanas palīg līdzekļi

	Kods
Smidzinātājs 1L pudelei	180 112

Detalizētāku informāciju par Schuelke dozēšanas palīg līdzekļiem Jūs atradīsiet mūsu mājaslapā www.schuelke.lv sadaļā Aksesuāri

Vides informācija

Schülke produkti ir ražoti ekonomiskā, modernā, drošā un videi draudzīgā ražošanas procesā, tajā pašā laikā saglabājot augstus kvalitātes standartus.

Ekspertu viedokļi un pārēja informācija

Lūdzu, apmeklējiet mūsu interneta mājas lapu, kur Jūs atradīsiet visu nepieciešamu literatūru un pārskatus par kodan[®] tinctur forte produktu: www.schuelke.lv

Jūsu individuālajiem jautājumiem:

Klientu apkalpošanas centrs

Tālr. 67795240

Web: <http://www.schuelke.lv>

Epasts: schuelke@interlux.lv

kodan[®] tinctur forte bezkrāsains

• **Sastāvdaļas:** aktīvās farmaceitiskās sastāvdaļas: 100g šķīduma satur: 2-propanols (Ph.Eur) 45,0 g, 1-propanols (Ph.Eur) 10,0 g, 2-bifenilols 0,20 g. • **Pārējās sastāvdaļas:** 30% ūdeņraža peroksīda šķīdums (Ph.Eur), attīrīts ūdens. • **Pielietošana:** ādas dezinfekcija pirms ķirurģijas, katetrizācijas, asins paraugu un cerebrospinālā šķidrums ņemšanas, injekcijām, punkcijām, ekscīzijām, kanulācijām, biopsijas ņemšanas u.c. Brūču un šuvju apstrādei. Higiēniskai roku dezinfekcijai Vispārējo higiēnas pasākumu uzturēšanai ādas sēnīšu infekciju profilaksē. • **Blaknes:** nelietot ķirurģiskai roku dezinfekcijai. Ja ir paaugstināta jutība pret kādu no sastāvdaļām. • **Nevēlamās blakusparādības:** biežas lietošanas gadījumos var rasties ādas kairinājumi, tādi kā piem., apsārtums, dedzināšanas sajūta, sausums. Retos gadījumos ir iespējamās alerģiskās reakcijas. Ja Jūs novējojāt nevēlamās blakusparādības, kas nav minētas šajā sarakstā, lūdzu, informējiet savu ārstu vai farmaceitu. • **Piesardzības pasākumi:** ārīgai lietošanai. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Pirms pārsiešanās ļaujiet kodan[®] tinctur forte bezkrāsainam pilnībā nožūt. Lietojiet termokauteri tikai pēc pilnīgas ādas izžūšanas.

kodan[®] tinctur forte iekrāsots

• **Sastāvdaļas:** aktīvās farmaceitiskās sastāvdaļas: 100g šķīduma satur: 2-propanols (Ph.Eur) 45,0 g, 1-propanols (Ph.Eur) 10,0 g, 2-bifenilols 0,20 g. • **Pārējās sastāvdaļas:** hinoļīna dzeltenais, gamboge S, brīlanta melnais BN, 30% ūdeņraža peroksīda šķīdums (Ph.Eur), attīrīts ūdens. • **Pielietošana:** ādas dezinfekcija pirms ķirurģijas, katetrizācijas, asins paraugu un cerebrospinālā šķidrums ņemšanas, injekcijām, punkcijām, ekscīzijām, kanulācijām, biopsijas ņemšanas u.c. Brūču un šuvju apstrādei. Higiēniskai roku dezinfekcijai Vispārējo higiēnas pasākumu uzturēšanai ādas sēnīšu infekciju profilaksē. • **Blaknes:** nelietot ķirurģiskai roku dezinfekcijai. Ja ir paaugstināta jutība pret kādu no sastāvdaļām. • **Nevēlamās blakusparādības:** biežas lietošanas gadījumos var rasties ādas kairinājumi, tādi kā piem., apsārtums, dedzināšanas sajūta, sausums. Retos gadījumos ir iespējamās alerģiskās reakcijas. Ja Jūs novējojāt nevēlamās blakusparādības, kas nav minētas šajā sarakstā, lūdzu, informējiet savu ārstu vai farmaceitu. • **Piesardzības pasākumi:** ārīgai lietošanai. Nelietot vietās, kur ir sastopams karstums/dzirksteles/atklāta uguns/karstas virsmas. Pirms pārsiešanās ļaujiet kodan[®] tinctur forte bezkrāsainam pilnībā nožūt. Lietojiet termokauteri tikai pēc pilnīgas ādas izžūšanas.



Schülke & Mayr GmbH ir sertificēta atbilstoši DIN EN ISO 9001, DIN EN ISO 14001 un DIN EN ISO 13485 (Reģ. Nr. 004567-MP23) un ir validējusi vides vadības sistēmu atbilstoši Eco Audit prasībām (Reģ. Nr. DE-150-00003).



Schülke&Mayr GmbH
22840 Norderstedt, Germany
Phone +49 (0) 40 - 521 00 - 0
Fax +49 (0) 40 - 521 00 - 318
www.schuelke.com
mail@schuelke.com

Schülke&Mayr Ges.m.b.H
Seidengasse 9
1070 Wien, Austria
Phone +43 (0)1-523 25 01- 0 Tālr. +371 67795240
Fax +43 (0)1- 523 25 01 - 60 Fakss +371 67795240
office@schuelke.at

Interlux, SIA
"Jaunbūmanī", 2.korp.
Dreilīni, Stopiņu nov., LV2130
Phone +371 67795240
Tālr. +371 67795240
Fakss +371 67795240
schuelke@interlux.lv
www.schuelke.lv