

Softasept N

Šķīdums lietošanai uz ādas

Etanols 74,1% un 2-propanols (Ph.Eur.) 10,0%

Lietošanai gatavs ādas dezinfekcijas līdzeklis

Baktericīda (iesk. Mikobaktērijas), fungicīda, pret vīrusu (plus Rotavīrus) iedarbība.

Sastāvdaļas: 100ml šķīduma satur: aktīvās vielas: etanols(100%) 74,1 g, 2-propanols(Ph.Eur.) 10,0 g, palīgvielas: attīrīts ūdens.

Viegli uzliesmojošs. Uzglabāt cieši noslēgtu. Sargāt no uguns-Nesmēķēt! Nesmidzināt atklātā liesmā. Nepieļaut nokļūšanu acīs. Nelietot uz ievainotas ādas un gļotādas.

Tikai ārīgai lietošanai. Uzliesmošanas punkts 14°C pēc DIN 51755.

Produkts un konteineris likvidējams drošā veidā. Neizlietoto produktu iznīcina kā bīstamos atkritumus saskaņā ar likumdošanu. Tukšos konteinerus var pārstrādāt saskaņā ar likumdošanu, atjaunot vai iznīcināt.

Pirmās palīdzības pasākumi

Nekavējoties novilk kontaktā bijušo apģērbu.

Ja Jums ir slikta pašsajūta, nepieciešama neatliekamā medicīniskā palīdzība.

Pie nejaušas tvaiku ieelpošanas, doties svaigā gaisā.

Ja simptomi nepāriet, konsultējaties ar ārstu.

Ja produkts nokļūst acīs, tās un arī vietas zem plakstiņiem jāskalo ar lielu ūdens daudzumu.

Ja ir acu kairinājums, konsultēties ar speciālistu.

Nejaušas norīšanas gadījumā, dzert daudz ūdeni.

Nekavējoties izsaukt ārstu.

Izraisīt pacienta vemšanu tikai pēc ārsta norādījuma.

Uzmanību! Uzmanīties no aspirācijas draudiem.

Lietošana: ādas dezinfekcija pirms operatīvas iejaukšanās, punkcijām un injekcijām.

Devas, lietošanas veids un ilgums

Softasept N lieto neatšķaidītu un ar sterilu tamponu uzklāj uz ādas. Apstrādājamā āda pilnībā jāsamitrina un jāuztur mitra visu iedarbības laiku.

Pēc iedarbības jāļauj ādai nožūt.

Ja lieto preoperatīvai ādas dezinfekcijai, jābūt uzmanīgam, lai preparāts „nesakrātos” zem pacienta, jo var rasties ādas kairinājums.

Iedarbības laiks:

Ādai ar maz tauku dziedzeriem:

- Injekcijām un punkcijām vidēji 15 sek.
- Pie locītavu punkcijām, cerebrospinālo kanālu punkcijām un pirms operācijām vidēji 1 min. (ja nepieciešams, atkārtota dezinficēšana).

Ādai ar daudz tauku dziedzeriem (piem., galva, rajons virs augšējā krūšu kaula, rajons starp plecu lāpstiņām) :

- Pie jebkuras iejaušanās vidēji 2,5 min. (atkārtota dezinficēšana).

Pirms elektrisku iekārtu lietošanas ļaut preparātam uz ādas nožūt.

Pēc atvēršanas var lietot 12 mēnešus, bet ne ilgāk par derīguma termiņu, kas norādīts uz iepakojuma.

Ražotājs

B.Braun Melsungen AG

345209 Melsungen

Vācija